



JYNARQUE®
(tolvaptan) tablets

Preparación para comenzar el tratamiento con JYNARQUE® (tolvaptán)

JYNARQUE es un medicamento recetado que se usa para enlentecer el deterioro de la función renal en adultos con riesgo de enfermedad renal poliquística autosómica dominante (ADPKD) de progresión rápida.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD SELECCIONADA:

Problemas hepáticos graves. JYNARQUE puede provocar problemas hepáticos graves que pueden llevar a requerir un trasplante de hígado o pueden provocar la muerte. Deje de tomar JYNARQUE y llame a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene alguno de los siguientes síntomas: sensación de cansancio, fiebre, pérdida del apetito, erupción, náuseas, picazón, dolor o sensibilidad en la parte superior derecha del vientre (abdomen), color amarillento de la piel y la parte blanca del ojo (ictericia), vómitos, orina oscura.

Lea la **INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD** en las páginas 16 y 17.

No es un paciente real.



Un paso importante en el manejo de la ADPKD



No es un médico o paciente real.

La elección de comenzar el tratamiento con JYNARQUE® (tolvaptán) marca un nuevo paso en su trayecto con la ADPKD. Con JYNARQUE, puede ayudar a enlentecer el deterioro de la función renal.

Tal vez tenga algunas preguntas sobre el tratamiento de la ADPKD con JYNARQUE, y sobre cómo manejar los efectos de su nuevo tratamiento. Este folleto ayudará a responder algunas de esas preguntas.

Como siempre, su médico debe ser su principal fuente de información sobre JYNARQUE. Si tiene preguntas adicionales, hágaselas a su médico, farmacéutico o a otro miembro de su equipo de tratamiento.

ADPKD=enfermedad renal poliquística autosómica dominante.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD SELECCIONADA:


Es importante que se haga un análisis de sangre antes de empezar a tomar JYNARQUE para ayudar a reducir el riesgo de problemas hepáticos. Su proveedor de atención médica le hará un análisis de sangre para evaluarle el hígado:

- antes de empezar a tomar JYNARQUE
- a las 2 semanas y a las 4 semanas de haber empezado el tratamiento con JYNARQUE
- luego todos los meses durante 18 meses mientras esté en tratamiento con JYNARQUE
- y cada 3 meses a partir de entonces

Debido al riesgo de problemas hepáticos graves, JYNARQUE solo está disponible a través de un programa de distribución restringido llamado Programa de Estrategia de Evaluación y Mitigación de Riesgos (REMS) de JYNARQUE.

Lea la INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD en las páginas 16 y 17.

Antes de recibir su medicamento, tenga en cuenta lo siguiente:



Pueden tardar 2-3 semanas en procesar su receta una vez que su médico la haya enviado a la farmacia.



Cuando su receta esté lista, recibirá una llamada de bienvenida de su farmacia especializada.

- En el futuro, puede esperar una llamada mensual de su farmacia especializada en relación con el resurtido de su receta
- Guarde el número de su farmacia especializada para no perder sus llamadas



Es posible que haya un programa de apoyo con los copagos para reducir sus costos de bolsillo. Asegúrese de consultar en su farmacia especializada si usted es elegible.



Luego de que se apruebe el envío de su receta, recibirá su medicamento y un kit de recursos de bienvenida



El Programa de Experiencia del Paciente está diseñado para apoyarlo en su proceso de tratamiento. Tendrá acceso a múltiples programas y servicios de Otsuka, como:

- Apoyo personal
- Comunicaciones y recursos
- Asistencia con los copagos

Para inscribirse en el Programa de Experiencia del Paciente, escanee el código QR o visite PatientExperienceProgram.com.



Los coordinadores de Experiencias de Pacientes (PEL), que son profesionales de la salud con licencia, están a su disposición en persona y por teléfono y correo electrónico para brindarle apoyo durante todo su recorrido con el tratamiento.

Ellos pueden ayudarle con lo siguiente:

- El Programa de REMS (Estrategia de Evaluación y Mitigación de Riesgos)
- Los pasos de acceso al tratamiento
- Preguntas sobre el seguro y apoyo
- Proceso de la farmacia especializada

Puede contactarse con un PEL o coordinar una reunión llamando a Otsuka Connect al **1-833-468-7852**. Los PEL están disponibles de 9 A. M. a 5 P. M.



Para más información, visite otsukapatientssupport.com o llame al **1-833-468-7852**.

Qué puede esperar

Saber qué puede esperar mientras se prepara para tomar JYNARQUE® (tolvaptán) lo ayudará a permanecer motivado y encaminado.

Esta es una breve descripción descripción, semana por semana, de las primeras 5 semanas de tratamiento.

Semana 1

- Trate de comenzar con la primera dosis un día no laborable o durante el fin de semana, para que tenga flexibilidad para ajustar su rutina
- Informe a su médico cuando comience con su primera dosis para que el consultorio del médico pueda pedir su primer análisis de sangre
- Hable con su familia acerca de cómo se verán afectados sus horarios y estilo de vida después de comenzar a tomar JYNARQUE. Por ejemplo, beberá mucha agua y tendrá que usar el baño con más frecuencia

Semana 2

- Programe su primer análisis de sangre para 14 días después de comenzar JYNARQUE. Mire la [página 7](#) para ver más detalles sobre cuándo programar su análisis de sangre
- Tómese un tiempo para adaptarse a su nueva rutina y hable con su familia, sus amigos y PEL para recibir apoyo

Semanas 3 y 4

- Programe su segundo análisis de sangre para 28 días después de comenzar JYNARQUE
- Más del 95% de las personas se adaptan a JYNARQUE durante las primeras semanas de tratamiento

Semana 5

- Para la semana 5, es posible que todavía se esté adaptando al tratamiento y a su nueva rutina
- Pasará a hacerse análisis de sangre mensuales durante los 18 meses siguientes, y luego cada 3 meses a partir de entonces

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD SELECCIONADA:

No tome JYNARQUE si:

- tiene antecedentes de problemas hepáticos o tiene signos o síntomas de problemas hepáticos, excepto enfermedad hepática poliquística
- no puede sentir si tiene sed o no puede reponer líquidos bebiendo
- le dijeron que la cantidad de sodio (sal) que tiene en la sangre es demasiado alta o demasiado baja
- está deshidratado
- es alérgico a tolvaptán o a cualquiera de los componentes de JYNARQUE
- no puede orinar

Lea la [INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD](#) en las páginas 16 y 17.

Farmacias especializadas

JYNARQUE® (tolvaptán) está disponible exclusivamente a través de 3 farmacias certificadas por el REMS. A diferencia de otros medicamentos que pueden buscarse en una farmacia tradicional, cuando se receta JYNARQUE la receta se enviará a una farmacia especializada y el medicamento se le entregará directamente a usted. Y lo que verdaderamente hace que estas farmacias sean especiales es que también ofrecen apoyo clínico y educativo, que incluye ayuda para tomar JYNARQUE y recordatorios sobre análisis de laboratorio y los resurtidos.

Guarde el número de teléfono de su farmacia para que no pierda ninguna de sus llamadas y pueda acceder fácilmente al número cuando tenga preguntas. Hay farmacéuticos disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, y traductores si los solicita.

allianceRx
Walgreens Pharmacy

alliancerxwp.com
Teléfono: (800) 480-9052

Optum

Specialty.OptumRx.com
Teléfono: (877) 719-6330


PANTHER
RAREX

pantherxrare.com
Teléfono: (833) 599-2245

La mayoría de las personas se adaptan a JYNARQUE después de las primeras semanas de tratamiento. A continuación hay algunos recordatorios que ayudarán a que comenzar el tratamiento sea más fácil y manejable.



Antes de comenzar JYNARQUE, piense en qué momento tomar la primera dosis. Trate de programarla para un día en el que no tenga que trabajar o para el fin de semana, cuando tiene más tiempo.



Tal vez tenga sed en exceso y necesidad de orinar con frecuencia mientras toma JYNARQUE, pero hay algunas medidas prácticas que puede adoptar. Vea en la [página 13](#) algunas formas de mantenerse encaminado.



Hablar con su familia e investigar juntos cómo cambiará su estilo de vida después de que empiece a tomar JYNARQUE ayudará a que su familia aprenda sobre la ADPKD y les servirá para saber cómo apoyarlo mejor mientras usted se adapta a su rutina cotidiana.



Hay varios recursos de apoyo a su disposición, como recursos en línea, aplicaciones, etc. Vea más información sobre las herramientas a su disposición, como aplicaciones para encontrar baños, en la [página 15](#).



Si tiene preguntas, en especial si se relacionan con la salud, contacte a su médico primero. Para recibir apoyo adicional, contacte a su PEL.

Usted y su médico se han unido a un programa de seguridad para ayudar a reducir su riesgo de lesión hepática

Su médico deberá monitorear la salud de su hígado mientras usted tome JYNARQUE. JYNARQUE puede provocar lesión hepática grave y potencialmente mortal.



El Programa de **REMS** de JYNARQUE se creó para ayudar a reducir el riesgo de lesión hepática grave para las personas que toman JYNARQUE.

- Con el tiempo, después de interrumpir JYNARQUE, ya no hubo ningún signo de lesión hepática

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD SELECCIONADA:

Informe a su proveedor de atención médica acerca de todas sus afecciones médicas; esto incluye decirle si:


- tiene antecedentes de niveles de sodio (sal) demasiado bajos
- está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si el tolvaptán daña al bebé en gestación. Informe a su proveedor de atención médica si queda embarazada o cree que podría estarlo
- está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si el tolvaptán pasa a la leche materna. No amamante durante el tratamiento con JYNARQUE. Hable con su proveedor de atención médica acerca de cuál es la mejor manera de alimentar a su bebé durante este período

Lea la INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD en las páginas 16 y 17.

Programación de sus análisis de sangre requeridos

Para reducir el riesgo de lesión hepática mientras toma JYNARQUE® (tolvaptán), se requieren análisis de sangre al inicio y nuevamente a las 2 semanas y a las 4 semanas después de iniciar el tratamiento.

- Luego, durante los siguientes 18 meses de tratamiento con JYNARQUE, se necesitarán análisis de sangre mensuales
- Cuando eso haya terminado, solo deberá hacerse un análisis de sangre cada 3 meses para poder seguir tomando JYNARQUE



Use el **calendario de REMS de JYNARQUE** para llevar un registro de **cuándo** debe programar sus análisis de sangre. Descargue el calendario en jynarque.com/downloadable-resources#calendar o escanee el código QR.

Usted y su médico trabajarán juntos para hallar la dosis de JYNARQUE correcta para usted

Tome JYNARQUE dos veces al día, a menos que su médico le indique otra cosa.

- Su médico puede aumentar su dosis de JYNARQUE durante su recorrido con el tratamiento
- Es importante tomar ambas dosis de JYNARQUE como se recetaron
- JYNARQUE puede tomarse con las comidas o sin alimentos
- **No** tome jugo de toronja durante el tratamiento con JYNARQUE. Eso podría hacer que tenga demasiado JYNARQUE en la sangre
- Si omite una dosis de JYNARQUE, **no** la duplique. Tome la siguiente dosis cuando lo haría normalmente

JYNARQUE viene en envases blíster que están etiquetados con los días de la semana. Las dosis de la mañana y de la tarde están marcadas claramente como “AM” y “PM”.



Tome la primera dosis al despertarse; tome la segunda dosis 8 horas más tarde. Tomar la segunda dosis 8 horas después de la primera puede ayudar a reducir la necesidad de despertarse para orinar.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD SELECCIONADA:

Dígale a su proveedor de atención médica todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos recetados, los medicamentos de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas.

- Tomar JYNARQUE con ciertos medicamentos podría hacer que tenga demasiado tolvaptán en la sangre. JYNARQUE no debe tomarse con ciertos medicamentos. Su proveedor de atención médica puede decirle si es seguro tomar JYNARQUE con otros medicamentos
- No empiece a tomar un medicamento nuevo sin hablar con su proveedor de atención médica

Lea la INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD en las páginas 16 y 17.


Dosis de JYNARQUE® (tolvaptán)

JYNARQUE se presenta en 5 concentraciones de dosis*




Comprimido de 15 mg

Triangular




Comprimido de 30 mg

Redondo




Comprimido de 45 mg

Cuadrado



Comprimido de 60 mg

Rectangular



Comprimido de 90 mg

Pentagonal

Su médico determinará qué combinación es apropiada para usted.

*No es el tamaño real.

La ADPKD es una enfermedad hereditaria

Tal vez quiera hablar sobre JYNARQUE con sus familiares



No son pacientes reales.

- Si se siente cómodo para hablar con sus familiares sobre su plan de tratamiento de la ADPKD, esta información tal vez los ayude a comprender lo que usted está atravesando.
- Hablar sobre sus experiencias con JYNARQUE puede ayudar a sus familiares a saber sobre el medicamento que usted está tomando.
- Como la ADPKD es una enfermedad hereditaria, también puede afectar a otros familiares. Puede ayudarles hablar sobre sus antecedentes familiares de ADPKD con su propio médico.

JYNARQUE® (tolvaptán) puede provocar efectos secundarios graves

Los efectos secundarios graves pueden incluir:

- **Lesiones hepáticas.** Vea más información más sobre las lesiones hepáticas y el **Programa de Estrategia de Evaluación y Mitigación de Riesgos (REMS) de JYNARQUE** en la [página 6](#)
- **Demasiado sodio en la sangre (hipernatremia) y pérdida de demasiado líquido corporal (deshidratación).** La deshidratación puede llevar a una pérdida extrema de líquido corporal, llamada hipovolemia. Debe tomar agua cuando tenga sed, y a lo largo del día y la noche
- Deje de tomar JYNARQUE y llame a su proveedor de atención médica si no puede beber suficiente agua por algún motivo, como no tener acceso a agua, tener vómitos o diarrea. Informe a su proveedor de atención médica si tiene alguno de los siguientes síntomas:
 - mareos
 - cambio en los latidos del corazón
 - desmayo
 - sensación de confusión o debilidad
 - pérdida de peso

Llame a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene alguno de los síntomas anteriores.

JYNARQUE se ha estudiado en más de 3000 pacientes con ADPKD



No es un médico o paciente real.

Los efectos secundarios más frecuentes de JYNARQUE® (tolvaptán) pueden requerir algunos ajustes en el estilo de vida

JYNARQUE puede provocar efectos secundarios, que incluyen **sed excesiva y orinar en exceso**. Estos efectos secundarios están relacionados con la forma en que JYNARQUE actúa en los riñones.



No es un paciente real.

¿Por qué ocurre esto?

En las células renales normales, una hormona llamada vasopresina ayuda a controlar la cantidad de agua en el cuerpo. Al tomar JYNARQUE, la vasopresina queda bloqueada, lo que hace que el cuerpo retenga menos agua; eso podría hacer que sienta sed y que tenga necesidad urgente de orinar.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD SELECCIONADA:

JYNARQUE puede causar efectos secundarios graves, como:

- **Demasiado sodio en la sangre (hipernatremia) y pérdida de demasiado líquido corporal (deshidratación).** En algunos casos, la deshidratación puede llevar a una pérdida extrema de líquido corporal, llamada hipovolemia. Debe tomar agua cuando tenga sed, y a lo largo del día y la noche. Deje de tomar JYNARQUE y llame a su proveedor de atención médica si no puede beber suficiente agua por algún motivo, como no tener acceso a agua, tener vómitos o diarrea. Informe a su proveedor de atención médica si tiene alguno de los siguientes síntomas:
 - mareos
 - cambio en los latidos del corazón
 - desmayo
 - sensación de confusión o debilidad
 - pérdida de peso

Lea la **INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD** en las páginas 16 y 17.

Prepárese para los efectos secundarios más frecuentes de JYNARQUE® (tolvaptán) con estas medidas prácticas

MEDIDAS PRÁCTICAS




Trate de llevar una botella de agua adonde vaya, para que siempre tenga algo para beber



No importa adónde vaya, planee con antelación y busque baños cercanos.

Para encontrar herramientas útiles, como **la aplicación para buscar baños**, **escanee el código QR** o visite jynarque.com/online-resources



Tome su primera dosis de JYNARQUE al despertarse y la segunda exactamente 8 horas después; tal vez pueda reducir la necesidad de despertarse para orinar

Consejos para el estilo de vida

Tomar JYNARQUE® (tolvaptán) puede cambiar la evolución de su enfermedad. Pero probablemente implique también cambios en su estilo de vida. Estos son algunos consejos que tal vez le ayuden a adaptarse.




CUENTE LO QUE LE PASA

- Hable con su médico para asegurarse de saber exactamente cómo tomar JYNARQUE
- Dígale a todo su equipo de atención médica y farmacéutico que está tomando JYNARQUE
- Si se siente cómodo, puede hablar con las personas que conoce acerca de su tratamiento, incluida la necesidad de tomar agua y de ir al baño con frecuencia



SIGA UN CALENDARIO

- Cree un evento recurrente en su calendario para recordar las fechas de sus próximos análisis de laboratorio y otras citas
- Cree alarmas en su teléfono como ayuda para recordarle cuándo tomar JYNARQUE
- Hay recursos útiles que pueden ayudarle a seguir un calendario, como el Calendario de recordatorios de análisis de laboratorio (Lab Test Reminder Calendar) o la aplicación Healthy Living (Vida saludable) en: jynarque.com/downloadable-resources o escanee este código QR



ELABORE UN PLAN

- Descargue una aplicación que pueda usar para encontrar baños cercanos cuando está de viaje
- Tenga botellas de agua extra a mano: en la oficina, en su casa y en el automóvil
- Asegúrese de orinar antes de las reuniones, de la cena, de ir al cine o de otros eventos sociales

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD SELECCIONADA:

¿Qué debe evitar mientras tome JYNARQUE?

No tome jugo de toronja durante el tratamiento con JYNARQUE. Eso podría hacer que tenga demasiado tolvaptán en la sangre.

Lea la INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD en las páginas 16 y 17.

Recursos y enlaces útiles

JYNARQUE® (tolvaptán)

- [Acerca de JYNARQUE](#)
- [El Programa de REMS](#)
- [Asistencia con los copagos](#)
- [Programa de Mentores de Pares en la ADPKD](#)
 - Hable con un Mentor de Pares para oír su historia sobre la vida con ADPKD de progresión rápida y el uso de JYNARQUE. Llame hoy para registrarse: **1-855-415-7459**

ORGANIZACIONES E INFORMACIÓN



pkdcure.org



kidney.org



kidneyfund.org

APOYO Y MENTOREO

- [Programa de Mentores de Pares de PKD Foundation](#)
- [Pares en la NKF](#)
- [Asociación Estadounidense de Pacientes Renales](#)
- [American Kidney Fund](#)

Aplicaciones para encontrar baños

- Sit or Squat: buscador de baños
- Flush: buscador de baños y mapa
- Toilet Finder (buscador de baños)

Aplicaciones para una vida saludable

- [My Food Coach](#)
- [H2O Overload: control de líquidos para la salud cardíaca-renal](#)

Esta lista no es exhaustiva.



Escanee este código QR para ver más información sobre algunos **consejos para el estilo de vida** o visite jynarque.com/tips-while-on-treatment

INDICACIÓN:

¿Qué es JYNARQUE?

JYNARQUE es un medicamento recetado que se usa para enlentecer el deterioro de la función renal en adultos con riesgo de enfermedad renal poliquística autosómica dominante (ADPKD) de progresión rápida. Se desconoce si JYNARQUE es seguro y eficaz en niños.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD:

- **Problemas hepáticos graves.** JYNARQUE puede provocar problemas hepáticos graves que pueden llevar a requerir un trasplante de hígado o pueden provocar la muerte. Deje de tomar JYNARQUE y llame a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene alguno de los siguientes síntomas:
 - sensación de cansancio
 - pérdida del apetito
 - náuseas
 - dolor o sensibilidad en la parte superior derecha del vientre (abdomen)
 - vómitos
 - fiebre
 - erupción
 - picazón
 - color amarillento de la piel y la parte blanca del ojo (ictericia)
 - orina oscura

Es importante que se haga un análisis de sangre antes de empezar a tomar JYNARQUE, para ayudar a reducir el riesgo de problemas hepáticos. Su proveedor de atención médica le hará un análisis de sangre para evaluarle el hígado:

- antes de empezar a tomar JYNARQUE
- 2 semanas y 4 semanas después de comenzar el tratamiento con JYNARQUE
- luego mensualmente durante 18 meses mientras esté en tratamiento con JYNARQUE
- y cada 3 meses a partir de entonces

Debido al riesgo de problemas hepáticos graves, JYNARQUE solo está disponible a través de un programa de distribución restringido llamado Programa de Estrategia de Evaluación y Mitigación de Riesgos (REMS) de JYNARQUE.

No tome JYNARQUE si:

- tiene antecedentes de problemas hepáticos o tiene signos o síntomas de problemas hepáticos, excepto enfermedad hepática poliquística
- no puede sentir si tiene sed o no puede reponer líquidos bebiendo
- le dijeron que la cantidad de sodio (sal) que tiene en la sangre es demasiado alta o demasiado baja
- está deshidratado
- es alérgico al tolvaptán o a cualquiera de los componentes de JYNARQUE
- no puede orinar

Informe a su proveedor de atención médica acerca de todas sus afecciones médicas; esto incluye decirle si:

- tiene antecedentes de niveles de sodio (sal) demasiado bajos
- está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si el tolvaptán daña al bebé en gestación. Informe a su proveedor de atención médica si queda embarazada o cree que podría estarlo
- está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si el tolvaptán pasa a la leche materna. No amamante durante el tratamiento con JYNARQUE. Hable con su proveedor de atención médica acerca de cuál es la mejor manera de alimentar a su bebé durante este período

Lea la **INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD** que continúa en la página siguiente.

Dígale a su proveedor de atención médica todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos recetados, los medicamentos de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas.

- Tomar JYNARQUE® (tolvaptán) con ciertos medicamentos podría hacer que tenga demasiado tolvaptán en la sangre. JYNARQUE no debe tomarse con ciertos medicamentos. Su proveedor de atención médica puede decirle si es seguro tomar JYNARQUE con otros medicamentos
- No empiece a tomar un medicamento nuevo sin hablar con su proveedor de atención médica

JYNARQUE puede causar efectos secundarios graves, como:

- **Demasiado sodio en la sangre (hipernatremia) y pérdida de demasiado líquido corporal (deshidratación).** En algunos casos, la deshidratación puede llevar a una pérdida extrema de líquido corporal, llamada hipovolemia. Debe tomar agua cuando tenga sed, y a lo largo del día y la noche. Deje de tomar JYNARQUE y llame a su proveedor de atención médica si no puede beber suficiente agua por algún motivo, como no tener acceso a agua, tener vómitos o diarrea. Informe a su proveedor de atención médica si tiene alguno de los siguientes síntomas:
 - mareos
 - cambio en los latidos del corazón
 - desmayo
 - sensación de confusión o debilidad
 - pérdida de peso

¿Qué debe evitar mientras tome JYNARQUE?

No tome jugo de toronja durante el tratamiento con JYNARQUE. Eso podría hacer que tenga demasiado tolvaptán en la sangre.

Los **efectos secundarios más frecuentes** de JYNARQUE son:

- sed y aumento de la ingesta de líquido
- producir grandes cantidades de orina, orinar con frecuencia y orinar por la noche


Esos no son todos los posibles efectos secundarios de JYNARQUE. Hable con su proveedor de atención médica acerca de cualquier efecto secundario que le moleste o que no desaparezca. Para más información, consulte a su proveedor de atención médica o al farmacéutico.

Si tiene alguna pregunta sobre su salud o los medicamentos, hable con su profesional de atención médica.

Para informar **SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS**, comuníquese con Otsuka America Pharmaceutical, Inc. llamando al [1-800-438-9927](tel:1-800-438-9927) o con la FDA llamando al [1-800-FDA-1088](tel:1-800-FDA-1088) (www.fda.gov/medwatch).

Lea la **INFORMACIÓN DE PRESCRIPCIÓN COMPLETA**, incluidos el **RECUADRO DE ADVERTENCIA** y la **GUÍA DEL MEDICAMENTO**.

Para más información, visite
JYNARQUE.com



JYNARQUE[®]
(tolvaptan) tablets